

BORRASCA[®] 450 EC

DATOS GENERALES:

Clase: Herbicida Agrícola

Formulación: Concentrado Emulsionable - EC

Registro Nacional ICA N° PL0020752023

Composición Garantizada:

Ingredientes activos:

Oxadiazon.....150 g/L

Butaclor.....300 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

BORRASCA[®] 450 EC es un herbicida pre-emergente para controlar malezas de hoja ancha, ciperáceas y gramíneas en el cultivo del arroz. Úselo sobre semilla tapada.

Presentaciones Autorizadas:

4L, 20L.

Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	*L.M.R. (mg/kg)	**P.C. (días)	***P.R. (horas)
ARROZ	Gramíneas: Falsa Caminadora (<i>Ischaemun rugosum</i>), Leptocloa (<i>Leptocloa filiformis</i>), Liendrepuerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guardarrocio (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Pategallina (<i>Eleusine indica</i>).	3,0	*0.01	****N.A.	0
	Hojas anchas: Bledo (<i>Amarantus dubius</i>), Botón Blanco (<i>Eclipta alba</i>), Palo de Agua (<i>Ludwigia linifolia</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>).		**0.5		

BORRASCA[®] 450 EC

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS L/ha	*L.M.R. (mg/kg)	**P.C. (días)	***P.R. (horas)
ARROZ	Cyperaceas: Cortadera (<i>Cyperus ferax</i>).	3,0	*0.01	****N.A.	0
			**0.5		

L.M.R.: Límite máximo de Residuos. *Oxadiazon fuente: EU / ** Butachlor fuente: USDA (Gain report). *P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. **P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ***N.A.: No aplica.

MODO DE EMPLEO:

La aplicación se debe realizar sobre suelos con buen drenaje y sin charcos.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Con el fin de conseguir una aplicación uniforme y con la dosis recomendada, CALIBRE EL EQUIPO DE ASPERSIÓN ANTES DE LA APLICACIÓN. Disuelva completamente la cantidad a utilizar del plaguicida y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga agua hasta la mitad. Agregue agua hasta completar el volumen total y agite hasta que la mezcla sea homogénea

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de mezclar BORRASCA[®] 450 EC con otros herbicidas se recomienda efectuar pruebas preliminares de compatibilidad. Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es de esperar que se presenten problemas de fitotoxicidad.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Extremadamente tóxico para organismos acuáticos."
- "No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo."
- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."

- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."

- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."

- "No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."

- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

BORRASCA[®] 450 EC

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

