

GLIFOCIDA® 480 SL

DATOS GENERALES:

Clase: Herbicida Agrícola

Formulación: Concentrado Soluble - SL

Registro Nacional ICA N° PL0000982024

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Glyphosate.....355.6 g/L

N-(phosfonomethyl) glycine equivalente a 480 g/L de

Glyphosate isopropylammonium salt

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

GLIFOCIDA® 480 SL Herbicida sistémico no selectivo de amplio espectro sobre el follaje con rápida translocación a través de la planta. Se inactiva en contacto con el suelo.

Presentaciones Autorizadas:

1 L, 4 L, 20 L, 200 L.

Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

“Consulte con un Ingeniero Agrónomo”

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	*L.M.R.	**P.C. (días)	***P.R. (horas)
ARROZ	Cortaderas (<i>Cyperus spp</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Barba de indio (<i>Fimbristylis annua</i>), Batatillas (<i>Ipomoea spp</i>), Falsa caminadora (<i>Ischaenum rugosum</i>), Arroz rojo (<i>Oriza sativa</i>), Verdolaga (<i>Portulaca orelacea</i>), Uchuva (<i>Physalis angulata</i>), Caminadora (<i>Rottboelia exaltata</i>), Palo de agua (<i>Ammania coccinea</i>), Piñita (<i>Murdania nudiflora</i>).	4.0 L/ha	0.1 mg/kg	**** N.A.	0

GLIFOCIDA[®] 480 SL

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS	*L.M.R.	**P.C. (días)	***P.R. (horas)
CAFÉ	Ciperáceas, de hoja ancha y angosta: Amor de madre (<i>Thumbergia alata</i>), Amor seco (<i>Bidens pilosa</i>), Diente de león (<i>Emilia sonchifolia</i>), Escoba (<i>Sida acuta</i>), Guasca (<i>Galinsoga ciliata</i>), Mastranto (<i>Hiptis mutabilis</i>), Pasto o paja brava (<i>Paspalum paniculatum</i>), Cortadera (<i>Cyperus diffusus</i>).	2.5 L/ha	0.1 mg/kg	**** N.A.	0
PASTOS	Diente de leon (<i>Taraxacum officinale</i>), Pasto kikuyo (<i>Pennisetum clandestinum</i>), Falsa poa (<i>Holcus lanatus</i>), Trebol (<i>trifolium repens</i>), Cafecillo (<i>Cassia occidentalis</i>), Pato braquiaria (<i>Brachiaria decumbes</i>), Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>), Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>), Verbena (<i>Stachytropheta cayennensis</i>), Pasto argentina (<i>Cynodom dactylon</i>), Helecho (<i>Pteridium aquilinum</i>), Bledos (<i>Amaranthus spp</i>), Guardarrocio (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Escoba (<i>Sida spp</i>), Cortaderas (<i>Cyperus spp</i>), Liendre puerco (<i>Echinochloa colona</i>), Guasca (<i>Gallinsoga ciliata</i>), Batatillas (<i>Ipomoea spp</i>).	2.5 L/ha	**** N.A.	**** N.A.	0
CAÑA DE AZÚCAR	COMO MADURANTE	2.0 L/ha	0.1 mg/kg	30	0
PLÁTANO	Pringamosa (<i>Jatrofa urens</i>), Emilia (<i>Hemilia sanchifolia</i>), Falsa poa (<i>Holcus lanatus</i>), Trebol (<i>Trifolium repens</i>), Pega pega (<i>Desmodium tortuosum</i>), Dormidera (<i>Mimosa pudica</i>), Verbena (<i>Stachytropheta cayennensis</i>), Pasto argentina (<i>Cynodom dactylon</i>), Siempreviva (<i>Commelia difusa</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Escoba (<i>Sida spp</i>), Cadillos (<i>Cenchrus spp</i>), Cortaderas (<i>Cyperus spp</i>), Hierba de conejo (<i>Panicus Trichoides</i>), Pasto guinea (<i>Panicum maximun</i>).	2.5 L/ha	0.1 mg/kg	**** N.A.	0

*L.M.R.: Límite máximo de Residuos: Fuente: Unión Europea. **P.C.: Período de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. ***P.R.: Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. ****N.A.: No aplica.

GLIFOCIDA® 480 SL

MODO DE EMPLEO:

Se debe realizar la aplicación sobre el follaje de las malezas que se encuentren creciendo vigorosamente. Aplique el producto en forma de aspersión con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas y según las dosis recomendadas en esta etiqueta. Cualquier condición climática o de suelo que favorezca el desarrollo vigoroso de las malezas, mejora la acción del producto

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Los equipos que se utilicen en la aplicación deben estar limpios y debidamente calibrados. Llene el tanque hasta la mitad, agregue la cantidad adecuada de producto, luego agregue el volumen total de agua requerido y agite bien la mezcla.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Las aplicaciones terrestres no deben realizarse cuando exista riesgo de que la aspersión sea llevada por el viento (deriva) sobre plantas o cultivos susceptibles. No mezcle este producto con otros herbicidas post-emergentes de contacto. Las mezclas de tanque con herbicidas hormonales y algunos herbicidas residuales formulados como polvos mojables, gránulos dispersables o suspensiones concentradas reducen el control de las gramíneas perennes.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- "Respetar la franja de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre con relación a los cuerpos de agua."
- "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar."
- "En caso de derrame, recoger el producto y gestionarlo según lo establecido por las autoridades competentes para este fin."
- "No contaminar las fuentes de agua con los

restos de la aplicación o sobrantes del producto, desechos o envases vacíos."

- "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre."

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 601 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

