

MULTIQUAT® 200 SL

DATOS GENERALES:

Clase: Herbicida Agrícola

Formulación: Concentrado Soluble - SL

Registro Nacional ICA N° PL0014342023

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Paraquat.....200 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

MULTIQUAT® 200 SL es un herbicida NO selectivo que actúa por contacto sobre el tejido verde de la planta. El producto se inactiva al contacto con las partículas del suelo.

Presentaciones Autorizadas:

1 L, 4 L, 20 L, 200 L.

Nocivo en caso de ingestión / Tóxico en contacto con la piel / Mortal si se inhala



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 2 - ALTAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	MALEZA	LMR	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
PAPA	MALEZAS GRAMÍNEAS Y DE HOJA ANCHA: Pasto quila (<i>Agrostis spp</i>), Bromo (<i>Bromus spp</i>), Pasto bermuda (<i>Cynodon dactylon</i>), Hualcacho (<i>Echinochloa crus-galli</i>), Ballica (<i>Lolium spp</i>), Chépica (<i>Paspalum spp</i>), Maicillo (<i>Sorghum hepense</i>), Bledo (<i>Amaranthus spp</i>), Bolsita del pastor (<i>Capsella bursa-pastoris</i>), Correhuela (<i>Convolvulus arvensis</i>), Quingüilla (<i>Chenopo- dium álbum</i>), Chamico (<i>Datura stramonium</i>), Galega (<i>Galega officinalis</i>), Malva (<i>Malva parvi- flora</i>), Manzanilla (<i>Matricaria chamomilla</i>), Sanguinaria (<i>Polygonum aviculare</i>), Verdolaga (<i>Portulaca oleracea</i>), Rábano (<i>Raphanus raphanistrum</i>), Zarzamora (<i>Rubus ulmifolius</i>), Quilloy-quillo (<i>Stellaria media</i>), Verónica (<i>Verónica persicae</i>), y Chufa (<i>Cyperus esculentus</i>).	***N.A.	2.5 L/ha	1	0

MULTIQUAT® 200 SL

CULTIVO	MALEZA	LMR	DOSIS	*P.C. (días)	**P.R. (horas)
ARROZ	MALEZAS ANUALES: Barba de indio (<i>Fimbristylis annua</i>), Falsa caminadora (<i>Ischaemum rugosum</i>), Liendre puerco (<i>Echinochloa colonum</i>), Guarda rocío (<i>Digitaria sanguinalis</i>), Verdolaga (<i>Portulaca orelacea</i>), Botoncillo (<i>Eclipta alba</i>), Arroz rojo (<i>Oryza sativa</i>), Palo de agua (<i>Ludwigia erecta</i>), Batatilla (<i>Iponomea triloba</i>), Paja mona (<i>Leptochloa sp</i>), Cortaderas (<i>Cyperus spp</i>), Caminadora (<i>Rottboellia exaltata</i>), Falsa uchuva (<i>Physalis angulate</i>).	***N.A.	3 L/ha	7	0

P.C.: Período de Carencia:** Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.: Período de Reingreso:** Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

MODO DE EMPLEO:

Papa: Aplique la dosis entre surcos dirigida a las malezas y asegure una buena cobertura del follaje de las mismas. Las malezas deben estar en etapa de crecimiento vigoroso y que no hayan alcanzado el estado de floración y/o fructificación. El mejor efecto se logra cuando las malezas tienen menos de 20 cm de altura y se hace una perfecta cobertura del follaje.

Arroz: Aplique antes de sembrar o antes de la emergencia del cultivo.

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Por vía terrestre utilice bombas de espalda o estacionarias debidamente calibradas. Dependiendo del follaje y las características de la maleza, se recomienda utilizar volúmenes de agua entre 200 y 400 litros por hectárea.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

No mezcle **MULTIQUAT® 200 SL** con herbicidas de contacto. Es incompatible con materiales alcalinos. NO ES SELECTIVO A NINGÚN CULTIVO O ESPECIE VEGETAL.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre y de 100 metros para aplicación aérea con relación a los cuerpos de agua o cursos de agua, carreteras, troncales, núcleos de población humana, personas, animales y/o cultivos susceptibles de daño por contaminación o cualquier otra área que requiera protección.
- No aplicar en condiciones climáticas que promuevan la deriva.
- Tóxico para organismos acuáticos. No permita que el producto contamine canales, aguas corrientes, aguas estancadas o el suelo.
- Después de hacer la aplicación lave los equipos y repase el cultivo con el agua de lavado. No vierta los residuos en fuentes de agua.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto ni con los desechos y envases vacíos.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MULTIQUAT[®] 200 SL

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Tratamiento médico de urgencia: Se debe practicar lavado gástrico exhaustivo evitando bronco aspiración. De al paciente un litro de solución de agua con tierra de fuller al 15% o carbón activado mas purgante. Vea Guía para los médicos en intoxicación con Paraquat.

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 - 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

