

# PROPOWOR<sup>722 SL</sup>

## DATOS GENERALES:

**Clase:** Fungicida Agrícola

**Formulación:** Concentrado soluble - SL

**Registro Nacional ICA N° PL0003822024**

### Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Propamocarb Hydrochloride.....722 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

### Descripción General:

**PROPOWOR 722 SL** es un fungicida sistémico, que ejerce acción preventiva y curativa, especialmente recomendado para el control de Oomicetos. Interfiere en la síntesis de fosfolípidos y ácidos grasos perturbando así la formación de la pared celular de los hongos. No aplique el producto si se espera lluvia una hora después de la aplicación, pues el nivel de control puede disminuir.

### Presentaciones Autorizadas:

1 L, 4L, 20L.

Nocivo en caso de ingestión /  
Nocivo en contacto con la piel  
Nocivo si se inhala /  
Tóxico para organismos acuáticos



**CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO**

**ATENCIÓN**



## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR.

**“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”**

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*L.M.R.	**P.C. (días)	***P.R. (horas)
PAPA	Gota ( <i>Phytophthora infestans</i> )	1.5 L/ha	0.3 mg/kg	1	4

P.C: Periodo de Carencia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. P.R: Periodo de reentrada: Tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas al área o cultivo tratado. L.M.R: Límite Máximo de Residuos. \* Fuente: (CODEX).

# PROPOWOR<sup>722 SL</sup>

## FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar preventivamente con el inicio de los primeros signos de infección, dentro de un Programa de Manejo Integrado (MIP). Se efectúa una aplicación, estableciendo el umbral económico de la plaga a controlar. Aplicar preferiblemente con viento en calma, para evitar arrastre hacia fuentes de agua. Se recomienda alternar con un producto de diferente mecanismo de acción, para evitar el desarrollo de la resistencia.

## EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:

Se recomienda aplicar el producto por aspersión foliar con la cantidad suficiente de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas. Llene el tanque hasta la mitad, agregue la cantidad adecuada de producto, llenar hasta el volumen total y agitar la mezcla. Aplicar con volumen de agua de 400 a 600 litros dependiendo del desarrollo del cultivo. Aplique bajo la dosis recomendada evitando la deriva.

## COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer pruebas previas de compatibilidad con otros productos. No fitotóxico bajo las recomendaciones de uso dadas; con nuevas variedades o híbridos vegetales se recomienda realizar pruebas previas.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:** Evite usar el producto en condiciones diferentes a las recomendadas. Para aplicaciones terrestres del producto, se deben dejar franjas de seguridad de 10 metros respectivamente, con relación a los cuerpos de agua, casas o carreteras. EN CASO DE DERRAME, RECOGER EL PRODUCTO Y GESTIONARLO SEGÚN LO ESTABLECIDO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ESTE FIN

## EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012

## INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

**“El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto”.**

## IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**FATECO COLOMBIA S.A.S.**

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.  
Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830  
Bogotá, D.C.

