

CYPROX 100 SL

DATOS GENERALES:

Clase: Fungicida Agrícola

Formulación: Concentrado Soluble (SL)

Registro Nacional ICA N° PL0008792023

Composición Garantizada:

Ingrediente activo:

Cyproconazole:.....100 g/L

Ingredientes aditivos.....c.s.p. 1 Litro

Descripción General:

CYPROX 100 SL es un fungicida perteneciente al

grupo de los triazoles, de acción sistémica y de movimiento acropetal, que se utiliza en el control preventivo, curativo y erradicante de un amplio espectro de enfermedades fungosas que afectan el follaje.

CYPROX 100 SL se distribuye en forma ascendente dentro de la planta, con gran velocidad de acción, lo que le permite detener rápidamente el desarrollo de los patógenos. Actúa inhibiendo la biosíntesis del ergosterol, evitando la formación de las membranas celulares de los hongos.

Presentaciones Autorizadas:

100 ml, 20 L, 200 L.

Nocivo si se inhala / Nocivo en caso de ingestión /
Nocivo en contacto con la piel / Muy tóxico para organismos acuáticos



CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 4 - LIGERAMENTE PELIGROSO

PELIGRO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Agítese bien antes de usar.

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C.(días)	**P.R.(horas)
ARROZ	AÑUBLO DE LA VAINA (<i>Rhizoctonia solani</i>)	0.4 L/ha	30	4

CYPROX^{100 SL}

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	*P.C.(días)	**P.R.(horas)
CLAVEL	MANCHA FOLIAR (<i>Cladosporium echinulatum</i>)	0.6 L/ha	***N.A.	4
CAFÉ	ROYA (<i>Hemileia vastatrix</i>)	0.2 L/ha	15	4

P.C.:** Período de Carenia: Días que deben transcurrir entre la última aplicación y la cosecha. *P.R.:** Período de Reingreso: Intervalo que debe transcurrir entre la aplicación y el reingreso de personas o animales al área o cultivo tratado. *****N.A.:** No aplica.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

"Respetar las franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicación terrestre, distantes de cuerpos o cursos de agua, carreteras, troncal, núcleos de población humana y animal, cultivos susceptibles de daño por contaminación, o cualquier otra área que requiera protección. En caso de derrame, recoja y deseche acorde con la autoridad local competente. "Para la protección de la fauna terrestre o acuática evite contaminar áreas fuera del cultivo a tratar". "Tóxico para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre" "No contamine fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto". "En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin."

ALMACENAMIENTO Y MANEJO DEL PRODUCTO:

"No almacenar en casas de habitación". "No almacenar ni transportar conjuntamente con alimento, medicinas, bebidas ni forrajes". - - - "No re-ensavar o depositar el contenido en otros envases". Almacene el producto en

sitio seguro retirado, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco y seco). **"Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado"**.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de **CYPROX 100 SL** de acuerdo a la tabla de usos, condiciones ambientales y con base a los resultados del monitoreo y el umbral de acción, aplicándose dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, y complementando con demás prácticas de manejo integrado de cultivo y recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas (FRAC).

Para **Clavel** realizar una aplicación con la aparición de los síntomas de la enfermedad y bajo un programa de manejo integrado de enfermedades. Para **Arroz** se recomienda realizar una aplicación en estado de macollamiento a embuchamiento cuando se presenten los primeros síntomas de la enfermedad. Para **Café** se recomienda iniciar aplicación a los 90 días después de la floración principal. Aplicar al comienzo de

CYPROX 100 SL

las lluvias, cuando la enfermedad comienza su curva ascendente y cuando el nivel de infección está alrededor del 5% (5 hojas de 100 presentan pústulas activas de roya), aplicar de acuerdo a los resultados de monitoreo y según la intensidad de la lluvia. La dosis de 0.2 L/ha es para poblaciones de 4000 árboles por hectárea, aplicar cuando el rocío sobre el cafetal (hojas, ramas y frutos) este seco.

EQUIPOS Y PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

CYPROX 100 SL debe ser diluido en agua y aplicado garantizando un cubrimiento total de las estructuras de las plantas. Se puede aplicar por vía terrestre en forma dirigida, utilizándose los equipos convencionales (pulverizadoras manuales, autopropulsadas y/o acopladas a tractor) los cuales deben estar en perfectas condiciones de uso (limpios y calibrados), que permitan que el producto tenga un óptimo desempeño; seguir los métodos de calibración recomendados por el fabricante del equipo a ser utilizado, utilizar boquillas adecuadas y presión baja para evitar que gotas muy pequeñas sean desplazadas y causen daño al cultivo o plantas no objetivo de control. Para preparar la mezcla de aplicación, llene el tanque hasta la mitad de su capacidad con agua, luego agregar la dosis recomendada del producto agitando continuamente y completar el volumen de agua. Continúe agitando hasta homogeneizar la mezcla. Realice el triple lavado del envase y agréguelo a la mezcla. La mezcla se debe aplicar inmediatamente.

Limpie bien el equipo usado después de aplicar el producto para que no haya daño a cultivos susceptibles que se asperjen después. Volúmenes de mezcla recomendados: Aplicación terrestre: Clavel 1200 L/ha; Arroz 120 a 150 L/ha; Café: 200-400L/ha Aplicación aérea: no menos de 16 gls/ha.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Se recomienda hacer una prueba previa de compatibilidad, bajo responsabilidad del usuario, para observar los aspectos físicos de las mezclas y sus reacciones sobre las plantas tratadas en los días siguientes a la aplicación. Si se aplica de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta, no se esperan problemas de fitotoxicidad.

EMERGENCIAS QUÍMICAS Y TOXICOLÓGICAS:

Cisproquim: (1) 288 6012 / 919 1919 – 018000916012

INFORMACIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto".

IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO POR:

Fateco Colombia S.A.S.

Av. Cra. 45 No. 108 - 27, Torre 2, Oficina 905.

Tel: 60 1 404 3723 | (+57) 313 649 2830

Bogotá, D.C.

